

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra.

A prímek összege: $2 + 5 + 2 = 9$;

824. a) $2^{-1}, 2^{-4}, 5^{-3}, 3^{-5}, 2 \cdot 5^{-4}, 4 \cdot 3^{-8}$;
 b) $3 \cdot 2^{-3}, 5 \cdot 3^{-3}, 9 \cdot 2^{-4}, 11 \cdot 7^{-1}, 16 \cdot 5^{-1}, 12 \cdot 10^{-2}$;

c) $a^{-3}, 3 \cdot x^{-4}, a^{-5}b^{-4}, (x+1)^{-3}, (a+2b)^{-1}$.

825. a) $2 \cdot a^2, x \cdot k^3, (x^2 - y^2)^3, a^2 b^5 x^{-3} y^4, b^3 a^{-3}$;
 b) $p^2 q^{-4} r^{-3} s^4, m^4 n^{-5} k^3 l^{-7}, (a+b)^{-7}, (x-y)^{-8}$;

826. $(a+b)^{-7}, (x-y)^2(x+y)^{-1}$.

827. $\frac{4}{a^2}, \frac{6}{b^{10}}, \frac{1}{y^6}, \frac{1}{a^2 b^4}, \frac{1}{p^6 q}, \frac{1}{xy^2 z^3 y^4}$.

828. a) $\frac{y^2}{x^2}, \frac{1}{a}, \frac{6}{x^3 y^2}, \frac{b^4}{p^6}, \frac{x^2 y^2}{x+y}$.

b) $\left(\frac{a+b}{ab}\right)^2, \frac{x-y}{x+y}, \left(\frac{a^2+b^2}{ab}\right)^2$.

829. $\frac{1+a}{1-a}, \frac{p^3+q^3}{p^3-q^3}, x^2+y^2+z^2$.

830. $3,8 \cdot ab = -1,9$.

831. a) $\frac{1}{3} \cdot x^3 y^3 = -\frac{1}{3}$; b) $\left(\frac{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b}}\right)^{-1} = \frac{b+a^2}{b-a^2} = \frac{73}{71}$;

c) $\frac{(p^2-1)(p+1)}{p^2+1} = \frac{25}{26}$.

832. A helyesen kitöltött keresztrejtvény (a függ. 4. első két számjegye felcserélhető): 832. ábra.

A számjegyek összege: 43.

833. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 833. ábra. A számjegyekkel felírható legnagyobb hatjegyű szám: 999 411.

834. a) $x^{-2}, a^{10}, p^{14}, b^{-7}, 1$;

b) $a^{13}, x^8, q^{-1}, 1$;

c) $1+x+x^2, 2a^3+2a^2+2a, 6y^7+4y^3-3y^2$;

d) $a^{15}, b^{60}, x^{-4}, p^2, 1$.

835. a) $a^{-2} b^{20} x^5, p^{30} q^{-14} r^8, x^{-15} y^{-12} s^{18}$;

b) $\frac{a^3 b^5 c^{11} x^8}{y^6}, \frac{p^{10} q^4 k^{-8}}{x^{16} y^2}$.

823.

¹ 1	6	
2		² 1
³ 8	5	2

IV

832.

¹ 1	² 8	6	
³ 3	1		⁴ 1
3			2
⁵ 1	7	2	8

833.

	¹ 9	
² 4	9	
³ 9	1	1

IV

836. a) $a^2 b^2$, $x^4 y^{-5} + x^3 y^2 + xy$;

b) $pq(p+q)(1+p^2 q^2)$, $a^4 - b^4 + ab(a-b) + \frac{a^2}{b^2}(a^3 - b^3)$;

c) $a^5 b^{-1} + \frac{ab}{x^6}$, $\frac{x^3}{y^3} - \frac{1}{xy^4} + x^4 - 1 + \frac{1}{x^4 y} - xy^3$.

837. a) $20^{100} > 100^{20}$; b) $10^{16} > 16^{10}$;

c) egyenlők; d) $\frac{5}{7^{10} \cdot 3^{11}} < \frac{12}{7^{11} \cdot 3^{10}}$.

838. a) Ha $q < 1$, akkor az első szám, ha $q > 1$, akkor a második szám a nagyobb, $q = 1$ esetén a két szám egyenlő.

b) Az első szám a nagyobb.

839. a) hamis, b) hamis, c) igaz, d) igaz.

840. a) igaz, b) igaz.

841. A hatványozás azonosságai alapján a tört ilyen alakra hozható:

$$\frac{23(23^n - 7^n) - 4 \cdot 4^n(19^n - 3^n)}{41(41^n - 25^n)}.$$

Innen pedig – tudva, hogy $a^n - b^n$ minden n -re osztható $a - b$ -vel – már következik az állítás.

842. A hatványozás azonosságai alapján a tört így alakítható:

$$\begin{aligned} \frac{7 \cdot 49^n + 34 \cdot 8^n}{18 \cdot 2^n + 23 \cdot 43^n} &= \frac{7(41+8)^n + 34 \cdot 8^n}{18 \cdot 2^n + 23(41+2)^n} = \frac{7 \cdot 41K + 7 \cdot 8^n + 34 \cdot 8^n}{18 \cdot 2^n + 23 \cdot 41M + 23 \cdot 2^n} = \\ &= \frac{7 \cdot 41K + 41 \cdot 8^n}{23 \cdot 41M + 41 \cdot 2^n}. \end{aligned}$$

843. Legyenek a háromszög oldalai: $2^k < 2^n < 2^r$. Elég belátni, hogy nincs olyan k, n, r pozitív egész számhármassal, melyre

$$2^k + 2^n > 2^r$$

teljesülne. Ha ugyanis ez igaz lenne, akkor

$$2^{k-r} + 2^{n-r} > 1$$

teljesülne, ami a feltételek miatt nyilván lehetetlen.

A négyzetgyök fogalma és azonosságai

844. a) 4, 13, 70, 50;

b) $|x|$, y^2 , $|a-1|$, $|b+3|$;

c) $|a+1|$, $|2x-1|$, $|3x-1|$;

d) $3|a|$, $6|b|$, $|a|$, $9y^6$.

- 845.** a) $|ac|$, $\frac{|a|b^2}{x^2|y^3|}$, $\frac{x^4r^2}{3|a^3|b^2}$, $\frac{|a+b|}{x^6y^8}$;
 b) $\frac{x^2y^4z^6}{a^2|b^3|c^4}$, $|x+y|$, $\frac{p^2q^2|p+q|}{|x^3|y^4(x+y)^2}$.
- 846.** a) $x \geq 1$, $x \geq -3$, $x \geq 6$, $x \leq -2$, $x \leq -3$ vagy $x \geq 3$;
 b) $x \geq -\frac{1}{2}$, $x \geq 1$, minden valós szám, minden valós szám, minden valós szám;
 c) $x = 2$, $x = -3$, $x \leq 1$ vagy $x \geq 7$, $-6 \leq x \leq 0$.
- 847.** a) $x < -3$ vagy $x \geq 2$, $x < -2$ vagy $x \geq \frac{1}{2}$, $-2 \leq x < 1$ vagy $x \geq 2$,
 $x \geq 2$, $|x| \geq 2$;
 b) $x > -3$, de $x \neq 3$, $x \leq -\frac{2}{a}$ vagy $x > 0$, $x < 2$ vagy $x \geq \frac{5}{b}$,
 $x < 2$ vagy $x \geq \frac{b}{a}$.
- 848.** $|x| \geq 4$ vagy $|x| < 1$, $1 \leq x < 3$ vagy $6 \leq x < 8$, $6 \leq x < 8$.
- 849.** a) $A \cap B =: \{x \geq \sqrt{5}\}$, $A - B =: \left\{ \frac{1}{2} \leq x < \sqrt{5} \right\}$;
 b) $A \cap B =: \{-2 \leq x \leq 0\}$, $A - B =: \{-0 < x \leq 2\}$.
- 850.** $A \cap B =: \{x \leq -2 \cup -1 \leq x \leq 1 \cup 4 \leq x\}$, $A - B =: \{-2 < x < -1\}$.
- 851.** a) $5|x|$, $10|a|b\sqrt{b}$, $11a^2|b|$, $|p|qs^2\sqrt{q}$.
- 852.** a) $\frac{4a^2|x|}{3|d|z^2\sqrt{z}}$, $\frac{7(p+q)\sqrt{p+q}}{3|pq|}$, $\frac{a^2b^2}{|a+b|}$, $\frac{x^2|y^3|\sqrt{x}}{ab^2\sqrt{a}}$;
 b) $\frac{1}{xy} \cdot \sqrt{\frac{x^2-y^2}{xy}}$, $\frac{|ab|}{x^2y^2}$, $\frac{(x-y)^4}{p^2q^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{pq}}$.
- 853.** $\sqrt{\frac{a+b}{x^2-3x+1}}$, $\frac{2|x|}{|y|}$.
- 854.** a) hamis, b) hamis (egyenlők)
- 855.** a) igaz, b) hamis, c) hamis (egyenlők), d) igaz, e) igaz.
- 856.** a) $3\sqrt{2}$; b) $6\sqrt{3}$; c) $8\sqrt{2}$; d) $\frac{19}{2} \cdot \sqrt{3}$;
 e) $17\sqrt{x}$; f) $-4\sqrt{5}$; g) $14\sqrt{2b}$; h) $38\sqrt{3y}$.
- 857.** a) $4 + 24 - 20 = 8$; b) $30 + 45 - 30 = 45$;
 c) $7 - 2 = 5$; d) $8 - 3 = 5$;
 e) 1; f) 4.

IV

- 858.** a) $36 + 30 + 18 - 24 = 60$;
 b) $18 - 12 = 6$;
 c) $a^2b - b^2a = ab(a - b)$;
 d) $a^3b - b^3a = ab(a^2 - b^2)$;
 e) $7\sqrt{5} \cdot 0 = 0$;
 f) $(2\sqrt{2} - 2\sqrt{3})(\sqrt{3} + \sqrt{2}) = -2$;
 g) $x + y - (x - y) = 2y$;
 h) $\frac{3 + 2\sqrt{2}}{2} + \frac{1 - 2\sqrt{2}}{2} = 2$;
 i) $\sqrt{a^2 - a^2 + 4} = 2$.
- 859.** a) $|y|$; b) 1.
- 860.** $\sqrt{18}$, $\sqrt{100} = 10$, $\sqrt{40}$, $\sqrt{200}$, $\sqrt{343}$.
- 861.** a) $\sqrt{40}$, $\sqrt{\frac{15}{2}}$, $\sqrt{18}$, $\sqrt{\frac{3}{4}}$, $\sqrt{\frac{8}{7}}$;
 b) $\sqrt{a^2b}$, $\sqrt{x^4y^4}$, $\sqrt{12a^4}$, $\sqrt{100p^5}$, $\sqrt{4x^9y^5}$;
 c) \sqrt{pq} , \sqrt{rt} , $\sqrt{\frac{a^3}{b^3}}$, $\sqrt{\frac{x}{y}}$, $\sqrt{x^2y^2(x+y)}$.
- 862.** $\sqrt{(x-y)^2} = |x-y|$, $\sqrt{(x+a)^2} = |x+a|$, $\sqrt{\frac{2(p-q)}{p+q}}$.
- 863.** 3, 25, 45, 75.
- 864.** a) a^2b , x^4y , p^5q^3 , s^9t^{13} ;
 b) $-2\sqrt{2}$, $81\sqrt{3}$, $-12500\sqrt{2}$, 3969;
 c) $4 + 2\sqrt{3}$, $9 - 4\sqrt{5}$, $7 - 2\sqrt{10}$, $30 + 12\sqrt{6}$;
 d) $a + 1 - 2\sqrt{a}$, $x + y + 2\sqrt{xy}$, $pq(p + q - 2\sqrt{pq}) = pq(\sqrt{p} - \sqrt{q})^2$;
 e) $1 + x + 2\sqrt{x}$, $a + b - 2\sqrt{ab}$, $19 - 6\sqrt{2}$;
 f) $2 + \sqrt{2} - 2\sqrt{1 + \sqrt{2}}$, nincs értelme, $2a + 1 + 2\sqrt{a^2 + a}$.
- 865.** a) $6 + 2(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6})$, $8 - 2(\sqrt{10} + \sqrt{2} - \sqrt{5})$,
 $a^2 + 3a + 1 + 2\sqrt{a}(1 + a)$;
 b) $2\sqrt{20} + 8$, $4(\sqrt{3} - \sqrt{2})$;
 c) $2(a - 1)$, $\frac{a}{b^2} + \frac{b}{a^2} - \frac{2}{\sqrt{ab}}$, $\frac{x^3}{4} + \frac{x^2}{9} - \frac{x^2\sqrt{x}}{3}$.
- 866.** a) $\sqrt{2}(1 + \sqrt{3})$, $\sqrt{3}(1 - \sqrt{5})$, $\sqrt{7}(1 + \sqrt{7})$, $\sqrt{15}(\sqrt{5} + 1)$;
 b) $\sqrt{2}(1 - \sqrt{3} + \sqrt{5})$, $\sqrt{3}(1 + \sqrt{5} - \sqrt{6})$, $\sqrt{5}(1 + \sqrt{2} - \sqrt{3})$.

- 867.** a) $\sqrt{a}(\sqrt{a} + 1)$, $\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1 + \sqrt{y})$, $\sqrt{ab}(\sqrt{a} + \sqrt{b})$,
 $\sqrt{p}(\sqrt{p} + 1)(p + 1)$;
 b) $\sqrt{xy}(\sqrt{x} - \sqrt{y})$, $\sqrt{p}(q\sqrt{p} + 1)$, $\sqrt{x-y}(1 + \sqrt{x+y})$,
 $\sqrt{x+y}(x-y\sqrt{x-y})$;
 c) $(\sqrt{y} + \sqrt{q})(\sqrt{x} + \sqrt{p})$, $\sqrt{x}(y\sqrt{x} - 2\sqrt{y} + \sqrt{x})$.
- 868.** a) $ab(a + b - \sqrt{ab})$, $\sqrt{pq}(pq + q^2 - p^2 + pq\sqrt{pq})$;
 b) $(\sqrt{a} + 2\sqrt{b})^2$, $(x - \sqrt{x})^2$, $(p\sqrt{q} + q\sqrt{p})^2$;
 c) $\sqrt{x}(x-1)(\sqrt{x}-1)$, $(2\sqrt{a} + \sqrt{b})(1 + \sqrt{a} + \sqrt{ab})$.
- 869.** a) $\sqrt{\frac{2}{5}}$; b) $\sqrt{\frac{3}{2}}$; c) $\frac{\sqrt{7}}{3}$.
- 870.** a) $\frac{1}{\sqrt{a}}$; b) $\frac{x^2}{\sqrt{y}}$; c) p ; d) $\sqrt{a} - \sqrt{b}$.
- 871.** a) $\frac{\sqrt{xy}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$; b) $\frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{p} - \sqrt{q}}$.
- 872.** a) $(4\sqrt{3} - \sqrt{5})(4\sqrt{3} + \sqrt{5}) = 43$;
 b) $(7\sqrt{2} + 2\sqrt{3})(7\sqrt{2} - 2\sqrt{3}) = 86$;
 c) $\frac{(10\sqrt{3} - 1)(10\sqrt{3} + 1)}{11} = \frac{299}{11}$;
 d) $2(\sqrt{3} + 4\sqrt{2})(\sqrt{3} - 4\sqrt{2}) = -58$;
 e) $\frac{2}{5}(4\sqrt{6} - 3)(4\sqrt{6} + 3) = \frac{174}{5}$;
 f) $(12 + \sqrt{10})(12 - \sqrt{10}) = 134$;
 g) $\frac{(23 - 5\sqrt{7})(23 + 5\sqrt{7})}{3} = 118$;
 h) $25(2\sqrt{2} + \sqrt{3})(2\sqrt{2} - \sqrt{3}) = 125$.
- 873.** a) $(13 - \sqrt{5})(13 + \sqrt{5}) = 164$;
 b) 4;
 c) $\sqrt{4\sqrt{2} + 2}$.

IV

874. a) $3\sqrt{2}$, $2\sqrt{5}$, $4\sqrt{3}$, $3\sqrt{8}$, $\sqrt{11}$;

b) $\frac{\sqrt{6}}{3}$, $\frac{\sqrt{35}}{7}$, $3\sqrt{2}$, $\sqrt{10}$, 1;

c) $\frac{\sqrt{6}}{3}$, $\frac{5\sqrt{7}}{21}$, $\frac{\sqrt{10} + \sqrt{15}}{5}$, $\frac{3\sqrt{3} + \sqrt{6}}{6}$, $\frac{2\sqrt{10} + \sqrt{2}}{4}$.

875. a) \sqrt{a} , $\frac{\sqrt{ab}}{a}$, $\frac{p\sqrt{pq}}{q}$, $\frac{\sqrt{ab}}{b}$, $x\sqrt{y}$;

b) $\frac{\sqrt{ab}}{b}$, $b\sqrt{a}$, $\sqrt{a} + 1$, $\frac{a\sqrt{ab} + b\sqrt{a}}{ab}$, $2q\sqrt{pq}$;

c) $\frac{\sqrt{x-y}}{x-y}$, $\frac{(x-y)\sqrt{x+y}}{x+y}$, $\sqrt{p-q}$, $\frac{(a-b)\sqrt{a+b}}{2}$,
 $\frac{(2\sqrt{a} + 3\sqrt{b})\sqrt{a+b}}{a+b}$;

d) 1, $2\sqrt{2} - 1$, 25.

876. a) $\sqrt{3\sqrt{6}}$, $2\sqrt{\sqrt{2}}$, $2\sqrt{6\sqrt{2}}$, $\sqrt{\sqrt{a}}$, $\sqrt{pq\sqrt{q}}$;

b) $\sqrt{2} - 1$, $\sqrt{5} + 1$, $\frac{6(4 - \sqrt{6})}{5}$, $5(\sqrt{2} + 1)$, $2(2\sqrt{3} + 3)$;

c) $3 + \sqrt{3}$, $6 - 3\sqrt{2}$, $10 - 4\sqrt{5}$, $-\frac{3\sqrt{5} + 5\sqrt{3}}{2}$;

d) $(\sqrt{2} + 1)^2$, $\frac{(2\sqrt{2} + \sqrt{3})^2}{5}$, $-\frac{(3\sqrt{5} + 5\sqrt{3})^2}{30}$, $\frac{(\sqrt{17} + \sqrt{15})^2}{2}$;

e) $\frac{\sqrt{a} - 1}{a - 1}$, $\frac{a(\sqrt{a} + 1)}{a - 1}$, $\frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2}{x - y}$, $\frac{(p\sqrt{q} + q\sqrt{p})^2}{pq(p - q)}$;

f) $\frac{(1 + \sqrt{x})\sqrt{1 - x}}{1 - x}$, $(a + \sqrt{a^2 - 1})^2$, $\frac{\sqrt{p - 1} + \sqrt{q - 1}}{p - q}$,
 $\frac{\sqrt{p^2 + 1} + \sqrt{q^2 + 1}}{p - q}$;

g) $\frac{\sqrt{12} + \sqrt{18} - \sqrt{30}}{6}$, $(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})(\sqrt{10} - 2)$,

$4\sqrt{2 + \sqrt{3 + \sqrt{2}}}(\sqrt{3 + \sqrt{2}} - 2)(\sqrt{2} + 1)$.

877. a) $\left(\sqrt{4+\sqrt{7}} - \sqrt{4-\sqrt{7}}\right)^2 = 2, (\sqrt{2})^2 = 2$, tehát a kifejezés értéke: 0;

b) a kifejezés negatív;

c) a kifejezés értéke: 0;

d) a kifejezés negatív;

e) a kifejezés értéke: 0.

878. a) a kifejezés értéke: 0.

879. a) A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 879. ábra.

879.

	1	8	2	1
3	6			2
4	4	4		1

IV

A képezhető hétjegyű számok száma: $\frac{7!}{2! \cdot 2!} = 1260$.

880. a) $|5 - \sqrt{2}| + |5 + \sqrt{2}| = 10$;

b) $\frac{1}{|\sqrt{10} - 3|} - \frac{1}{|\sqrt{10} + 3|} = \frac{\sqrt{10} + 3 - \sqrt{10} + 3}{1} = 6$.

881. $\frac{(\sqrt{a} + 2)(\sqrt{a} + 1) - 2}{a - 1} \cdot \frac{a - 1}{\sqrt{a} + 3} = \sqrt{a}$.

882. a) Emeljünk négyzetre, és használjuk fel, hogy $(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 1$.

A kifejezés értéke: $\sqrt{6}$;

b) A zárójelben szereplő kifejezés: $\frac{-2\sqrt{p^2 - q^2}}{q}$. A végeredmény:

$q^2 - p^2$;

c) $\frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}}$;

d) A zárójelben szereplő kifejezés: $\frac{x+y}{x-y}$. Így az eredmény: $\sqrt{x} - \sqrt{y}$;

e) A kifejezés második tagja: $\frac{1}{\sqrt{a}(\sqrt{a} + \sqrt{b})}$. A végeredmény: $\frac{1}{\sqrt{a}}$;

f) A kifejezés első tagja: $\frac{\sqrt{p} - \sqrt{q}}{\sqrt{p} + \sqrt{q}}$. A végeredmény: 1;

g) Az első zárójelben szereplő kifejezés: $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$. A végeredmény: 1.

883. a) Mindkét oldalt négyzetre emelve adódik az egyenlőség.

b) Mindkét oldalt négyzetre emelve adódik az egyenlőség.

884. A bal oldal mindkét törtjének nevezőjét gyöktelenítve, a zárójeleket felbontva és összevonva a bizonyítandó egyenlőség:

$$\sqrt{(2 - \sqrt{3})^3} + \sqrt{(2 + \sqrt{3})^3} = 3\sqrt{6}.$$

Innen négyzetre emelés után adódik az egyenlőség.

885. A belső négyzetgyökök alatt teljes négyzetek szerepelnek:

IV

$$\sqrt{\frac{2\sqrt{a}}{a}(\sqrt{a} - 2 + \sqrt{a} + 2)} = \sqrt{4} = 2.$$

886. Szorozzuk meg mindkét oldalt a $\sqrt{(c+a)(c+b)}$ közös nevezővel. Innen átrendezés, kiemelés, négyzetre emelés, majd összevonás után a $c^2(c^2 - b^2 - a^2) = 0$ alakra jutunk, amiből már következik a bizonyítandó állítás.

887. Megmutatjuk, hogy ha $a > 1$, akkor

$$\sqrt{a-1} + \sqrt{a+1} < 2\sqrt{a}.$$

Ugyanis négyzetre emelés után

$$2a + 2\sqrt{a^2 - 1} < 4a, \text{ azaz } a^2 - 1 < a^2.$$

Ezen ötlet alapján a feladat $a)$, $b)$ része már könnyen igazolható.


888. Az előző feladat alapján ez is könnyen igazolható.

889. Emeljük négyzetre mindkét oldalt, majd összevonás után használjuk fel, hogy $ad = bc$.

890. A $\frac{-x^2 + px - p + x}{x^2 - 2005x + 2004} \geq 0$ egyenlőtlenségnek kell teljesülnie. Ábrázoljuk

a számlálóban és a nevezőben szereplő másodfokú kifejezéseket egy koordináta-rendszerben. A nevező zérushelyei: 1 és 2004, a számláló zérushelyei: 1 és p .


890.



Ha $p \leq 2004$, akkor az értelmezési tartomány egyetlen prímet sem tartalmaz. Ha $p > 2004$, akkor az értelmezési tartomány: $2004 < x \leq p$. Mivel a 2004 utáni első prímszám 2011, ezért a megadott kifejezés értelmezési tartománya akkor nem fog egyetlen prímet sem tartalmazni, ha $p < 2011$.

891. Most a $-x^2 + (2+p)x - 2p \geq 0$ és $-x^2 + 2005 > 0$ egyenlőtlenségeknek kell teljesülniük. A számláló zérushelyei: 2 és p . A nevező zérushelyei: 0 és 2005. Az értelmezési tartománynak mindenképpen eleme a 2, ezért $p < 3$ kell, hogy legyen.

892. A $-4x^2 + 2(a+1)x - a \geq 0$ és $x^2 - 12x + 35 > 0$ egyenlőtlenségeknek kell teljesülniük. A nevező zérushelyei: 5 és 7, a számláló zérushelyei $\frac{1}{2}$ és $\frac{a}{2}$ (lásd ábra).

892.**IV**

Az értelmezési tartomány: $\frac{1}{2} \leq x < 5$ vagy $7 < x \leq \frac{a}{2}$.

Az értelmezési tartományban akkor lesz pontosan 5 db prímszám, ha

$$17 \leq \frac{a}{2} < 19, \quad \text{azaz} \quad 34 \leq a < 38.$$

893. A feltételek szerint: $10a + b = a^2 + b^2 + 2ab$, azaz $a^2 + 2a(b-5) + b^2 - b = 0$.

Ennek az a -ban másodfokú egyenletnek csak akkor lehet egész megoldása, ha a diszkriminánsa négyzetszám:

$$4(b-5)^2 - 4(b^2 - b) = K^2, \quad \text{ahonnan} \quad 25 - 9b = R^2.$$

Ez csak $b = 1$ -re teljesül, ahonnan pedig $a = 8$. $\sqrt{80} = 8 + 1$.

894. $|b| \leq 2005$. Azt vizsgáljuk, hogy az első két tag összege milyen b esetén lesz nagyobb a harmadik tagnál:

$$\sqrt{2005 + \sqrt{2005^2 - b^2}} - \sqrt{2005 - \sqrt{2005^2 - b^2}} > \sqrt{6}.$$

Négyzetre emelés után a következőre jutunk:

$$4010 - 2\sqrt{b^2} > 6, \quad \text{azaz} \quad |b| < 2002.$$

Ezek szerint

ha $|b| < 2002$, akkor a kifejezés értéke pozitív,

ha $|b| = 2002$, akkor a kifejezés értéke 0,

ha $2002 < |b| \leq 2005$, akkor a kifejezés értéke negatív.

Az n -edik gyök fogalma és azonosságai

895. a) 3, -3, 2, 5, -4;

b) 0,3 -2, 3, -3, -2;

c) $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{3}$, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{3}$;

d) nincs értelme, nincs értelme, nincs értelme, 3, $-\frac{5}{2}$.

IV

896. $a, |b|, |c|, |a|, x^2.$

897. a) $2 \cdot \sqrt[3]{3}, 2 \cdot \sqrt[4]{2}, 3 \cdot \sqrt[3]{2}, 2 \cdot \sqrt[5]{2}, 3 \cdot \sqrt[3]{3};$
 b) $2 \cdot \sqrt[3]{b^2}, 2 \cdot \sqrt[4]{4x^3}, 2b \cdot \sqrt[3]{2a^2b}, pq \cdot \sqrt[4]{pq^2}.$

898. a) $a \cdot \sqrt[k]{a}, b^2 \cdot \sqrt[n]{b}, x \cdot \sqrt[p]{x^q}, k \cdot \sqrt[n+1]{k^2};$
 b) $ab \cdot \sqrt[n]{a^2b}, c^3 d^2 \cdot \sqrt[k]{cd^3}, x^2 y \cdot \sqrt[k+2]{xy}.$

899. $\sqrt[3]{16}, \sqrt[3]{135}, \sqrt[4]{48}, \sqrt[5]{729}, \sqrt[4]{\frac{1}{8}}, \sqrt[3]{\frac{4}{9}}.$

900. a) $\sqrt[3]{a^4}, \sqrt[4]{b^5}, \sqrt[5]{c^{11}}, \sqrt[3]{a^{11}}, \sqrt[4]{a^6 b^7};$
 b) $\sqrt[3]{p^7 q^5}, \sqrt[8]{x^{35} y^{47}}, \sqrt[3]{\frac{a^5}{b^5}}, \sqrt[4]{\frac{m^3}{n^3}}.$

901. a) $\sqrt[6]{\frac{a^3}{p^4 q^2}}, \sqrt[6]{\frac{x^9}{y^{10} z^{14}}}, \sqrt[3]{\frac{a^4 b^7 c^{10}}{x^4 y^{13}}}, \sqrt[4]{(x+y)^3};$
 b) $\sqrt[3]{8(x^3 + x^4 + x^5)}, \sqrt[4]{81(m^{10} + m^{11})}, \sqrt[3]{8(a^8 b^3 - 3a^7 b^4 + 2a^4 b^5)};$

c) $\sqrt[3]{p+q}, \sqrt[3]{\frac{a+b}{a-b}}.$

902. a) 10, 12, $4\sqrt{2}$, 6;

b) $\frac{3}{2}, \frac{4}{5}, \frac{1}{15}, \frac{2}{3};$

c) 20, 10, 15, 14.

903. a) 144, $ab, p^2 q^2;$

b) $\sqrt[n]{x^{3n} y^{4n}} = x^3 y^4, \sqrt[k]{m^{k^2+4k} n^{3k}} = m^{k+4} n^3;$

c) $\sqrt[3]{144-19} = 5, \sqrt[4]{100-19} = 3, \sqrt[5]{64-32} = 2;$

d) $\sqrt[3]{49-22} = 243, \sqrt[4]{121-57} = 16\sqrt{2}.$

904. a) $\frac{2a^2}{3b^3}, \left(\frac{xy}{z}\right)^2, \frac{p^3 q^2}{2r};$

b) $x-y, m-n.$

905. a) $\sqrt[3]{27} = 3, \sqrt[4]{16} = 2, \sqrt[5]{32} = 2, \sqrt[3]{27} = 3;$

b) $\frac{1}{10}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}.$

906. a) $2a, 2x, 2p;$

b) $a^2 b, x^2 y^5, m^4 n^4 k^3.$

907. $\frac{ab}{c}, \frac{3x^4 y^7}{z^3}, \frac{2p^4 q^6}{3r^2}.$

908. Az $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ és $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ azonosságok alapján

a) 7; b) 6.

909. Az előző feladat azonosságai alapján a) $p + q$; b) $p - q$.

910. a) $\sqrt[6]{2}$, $\sqrt[12]{3}$, $\sqrt[10]{7}$, $\sqrt[12]{5}$, $\sqrt[42]{10}$;

b) $\sqrt[6]{a}$, $\sqrt[12]{b^5}$, $\sqrt[15]{x^4}$, $\sqrt[14]{y^5}$, $\sqrt[24]{z^3}$;

c) $\sqrt[6]{3^4}$, $\sqrt[12]{48}$, $\sqrt[15]{135}$, $\sqrt[12]{432}$, $\sqrt[15]{224}$.

911. a) $\sqrt[6]{a^4}$, $\sqrt[9]{a^4}$, $\sqrt[12]{b^8}$, $\sqrt[15]{x^{11}}$;

b) $\sqrt[12]{2^9}$, $\sqrt[24]{3^{11}}$, $\sqrt[12]{2^{10}}$;

c) $\sqrt[12]{\left(\frac{2}{3}\right)^3}$, $\sqrt[12]{\left(\frac{5}{7}\right)^4}$, $\sqrt[15]{\left(\frac{2}{9}\right)^5}$, $\sqrt[15]{\left(\frac{3}{11}\right)^4}$.

912. a) $\sqrt[12]{a^9}$, $\sqrt[36]{a^{19}}$, $\sqrt[6]{b^{25}}$;

b) $\sqrt[9]{\left(\frac{a}{b}\right)^4}$, $\sqrt[6]{\frac{p^{13}}{q^{11}}}$, $\sqrt[8]{\frac{1}{x^3}}$, $\sqrt[15]{\frac{m^{11}}{n^{14}}}$;

c) $\sqrt[24]{a^{17}}$, $\sqrt[36]{a^{29}}$, $\sqrt[90]{x^{98}}$.

913. $\sqrt[24]{\frac{x^7}{y^6}}$, $\sqrt[60]{\frac{p^{31}}{q^{42}}}$, $\sqrt[36]{\frac{p^5}{q^5}}$.

914. a) igaz, b) igaz, c) hamis, d) igaz, e) igaz.

915. a) hamis, b) hamis, c) igaz, d) igaz, e) hamis, f) igaz, g) igaz.

916. a) $\sqrt[4]{8}$, $\sqrt[12]{3^4 \cdot 4^3}$, $\sqrt[6]{5^5}$, $\sqrt[10]{4 \cdot 5^5}$;

b) $\sqrt[12]{9 \cdot 5^3}$, $\sqrt[15]{3^5 \cdot 4^3}$, $\sqrt[12]{2^4 \cdot 7^3}$, $\sqrt[21]{2^7 \cdot 3^3}$.

917. a) $\sqrt[6]{\left(\frac{3}{2}\right)^5}$, $\sqrt[6]{\frac{2}{3}}$, $\sqrt[4]{\left(\frac{3}{5}\right)^3}$, $\sqrt[12]{\left(\frac{5}{2}\right)^7}$;

b) $\sqrt[12]{\frac{2}{27}}$, $\sqrt[20]{\frac{1}{162}}$, $\sqrt[15]{\frac{5^2}{3^7}}$, $\sqrt[12]{\left(\frac{2}{3}\right)^{13}}$;

c) $\sqrt[4]{a^3}$, $\sqrt[12]{b^7}$, $\sqrt[30]{x^{11}}$, $\sqrt[24]{p^{11}}$;

d) $\sqrt[12]{a^{17}}$, $\sqrt[12]{x^{25}}$, $\sqrt[40]{p^{57}}$, $\sqrt[30]{m^{53}}$;

e) $\sqrt[15]{\left(\frac{b}{a}\right)^2}$, $\sqrt[12]{\frac{x^{11}}{y^{10}}}$, $\sqrt[30]{\frac{q^{19}}{p^3}}$, $\sqrt[20]{\frac{m^{47}}{n^{37}}}$.

IV

$$918. a) \sqrt[12]{\frac{a^{13}}{b^{13}}}, \sqrt[60]{\frac{p^7}{q^{14}}}, \sqrt[30]{\frac{1}{m^{16}n^{34}}};$$

$$b) \sqrt[12]{a^{31}}, \sqrt[12]{b^{27}}, \sqrt[30]{y^{53}};$$

$$c) \sqrt[12]{\left(\frac{a}{b}\right)^7}, \sqrt[30]{\frac{x^{65}}{y^{37}}}, \sqrt[24]{\frac{n^{25}}{m}}.$$

$$919. a) 2 - \sqrt[6]{2^7} + \sqrt[4]{2^5} = 2(1 - \sqrt[6]{2} + \sqrt[4]{2});$$

$$b) 3 + \sqrt[6]{3^7} - \sqrt[4]{3^5} = 3(1 + \sqrt[6]{3} - \sqrt[4]{3}).$$

$$920. a) a + \sqrt[6]{a^7} - \sqrt[4]{a^5} = a(1 + \sqrt[6]{a} - \sqrt[4]{a});$$

$$b) \sqrt{6} - \sqrt[4]{27} + \sqrt[6]{32} - \sqrt[12]{2^4 \cdot 3^3};$$

$$c) \sqrt[6]{x^{13}} - \sqrt[4]{x^{13}} + \sqrt[6]{x^5} - \sqrt[12]{x^{23}};$$

$$d) p - 3 \cdot \sqrt[6]{p^8} - \frac{1}{2} \cdot \sqrt[6]{p^7} + \frac{3}{2} \cdot \sqrt[6]{p^3};$$

$$e) \sqrt[3]{\frac{x-y}{x+y}}.$$

$$921. \text{ A szögletes zárójel első tagja: } \frac{(\sqrt[6]{m^2 n^5} - \sqrt[6]{n^2 m^5})^2}{\sqrt[6]{m^7 n^7}} = \frac{(\sqrt{m} + \sqrt{n})^2}{\sqrt{mn}}.$$

Ennek felhasználásával a kifejezés: $\frac{m-n}{mn}$.

922. Vigyük át a bal oldal utolsó tagját a jobb oldalra, majd emeljük köbre mindkét oldalt:

$$1 - 12 \cdot \sqrt[3]{7} + 6 \cdot \sqrt[3]{49} = (2 - \sqrt[3]{7})^3.$$

923. Legyen a kifejezés értéke k . Tegyük úgy, mint az előző feladat esetében:

$$1 - 27 \cdot \sqrt[3]{26} + 9 \cdot \sqrt[3]{26^2} = (k - \sqrt[3]{26})^3.$$

A műveletek elvégzése és a megfelelő átalakítások után kapjuk, hogy csak $k = 3$ lehet. Ezek után bizonyítsuk be – az előző feladathoz hasonlóan –, hogy

$$\sqrt[3]{1 - 27 \cdot \sqrt[3]{26} + 9 \cdot \sqrt[3]{26^2} + \sqrt[3]{26}} = 3.$$

924. Az egyenlet így alakítható:

$$nk \sqrt{a^{k+2}} \cdot nk \sqrt{a^{n+2}} = a, \text{ azaz } a^{n+k+4} = a^{nk}.$$

Innen

$$nk - n - k - 4 = 0, \quad (n-1)(k-1) = 5.$$

Innen pedig $n = 2$, $k = 6$, vagy fordítva.

925. Az előző feladathoz hasonló átalakítást végezve azt kapjuk:

$$pq - 2q - 3p - 5 = 0,$$

$$(q - 3)(p - 2) = 11.$$

Innen $q = 4$, $p = 13$, vagy fordítva.

926. A kifejezés így alakítható:

$$\sqrt[6]{(2 + \sqrt{3})^3} \cdot \sqrt[6]{\frac{2(3\sqrt{3} - 5)^2}{4}}.$$

A megfelelő műveletek elvégzése után kapjuk, hogy a kifejezés értéke: 1.

IV

Törtkitevőjű hatványok

927. a) 2, 2, 2, 3, 10;

b) 125, 81, 32, 27, 4;

c) $\frac{1}{1000}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{25}$, $\frac{1}{343}$, $\frac{1}{10}$.

928. 8, 32, 3125, $\frac{16807}{32}$, $\frac{243}{32}$.

929. a) $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[4]{125}$, $\sqrt[5]{16}$, $\sqrt[6]{6}$, $\sqrt[10]{10}$;

b) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$, $\frac{1}{\sqrt[3]{169}}$, $\frac{1}{\sqrt{54^3}}$, $\sqrt[3]{\frac{4}{9}}$, $\frac{8}{3\sqrt{3}}$;

c) $\sqrt[4]{a}$, $\sqrt[3]{b^2}$, $\frac{1}{\sqrt[4]{c}}$, $\frac{1}{\sqrt{x^3}}$, $\frac{1}{\sqrt[3]{p^4}}$;

d) $3\sqrt{x}$, $\frac{\sqrt[3]{a}}{3}$, $\sqrt[3]{\frac{a}{3}}$, $\frac{8}{\sqrt[3]{y^2}}$, $\frac{1}{4 \cdot \sqrt[3]{y^2}}$.

930. $\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[3]{b}$, $\frac{\sqrt[9]{y}}{\sqrt[12]{x}}$, $\frac{\sqrt[8]{n}}{\sqrt[8]{m^3}}$, $\frac{1}{q \cdot \sqrt[4]{p^5}}$.

931. a) igaz, b) hamis, c) hamis, d) hamis, e) igaz.

932. a) igaz, b) igaz, c) igaz, d) hamis.

933. a) igaz, b) hamis.

934. $a^{\frac{1}{3}}$, $x^{\frac{3}{4}}$, $p^{\frac{7}{5}}$, $x^{\frac{r}{n}}$, $m^{\frac{3}{k}}$.

935. a) $p^{\frac{2}{3}}q^{\frac{1}{3}}$, $r^{\frac{1}{4}}s^{\frac{3}{4}}$, $x^{\frac{3}{5}}y^{\frac{4}{5}}$, $m^{\frac{5}{6}}n^{\frac{4}{3}}$, $a^{\frac{2}{5}}b^{\frac{7}{10}}$;

b) $a^{\frac{3}{4}}$, $b^{\frac{7}{6}}$, $x^{\frac{9}{8}}$, $y^{\frac{4}{3}}$;

c) $a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}c^{\frac{1}{6}}$, $x^{\frac{4}{3}}y^{\frac{2}{9}}$, $p^{\frac{3}{4}}q^{\frac{1}{5}}$, $m^{\frac{13}{20}}$.

IV

$$936. a^{\frac{15}{16}}, b^{\frac{3}{4}}c^{\frac{1}{2}}, x^{\frac{3}{8}}y^{\frac{5}{8}}.$$

$$937. a) xy^{\frac{1}{2}} - yx^{\frac{1}{2}}, 10a^{\frac{1}{4}} + 15a^{\frac{1}{6}}, p - q;$$

$$b) m^5 - n^5, 2a + b^{\frac{1}{2}}a^{\frac{2}{3}} - 4a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{3}{2}} - 2b^2, x^{\frac{1}{2}} - x^2.$$

$$938. a) -b - 3b^{\frac{1}{2}}, -25x^{\frac{2}{3}} + 4x^{\frac{1}{3}} + 6;$$

$$b) p^{\frac{1}{12}}, m^{-\frac{23}{24}}, p^{-\frac{29}{24}}, x^{\frac{5}{4}}.$$

$$939. a) a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}}; b) \frac{x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}} + x^{\frac{3}{4}}}{x - x^{\frac{1}{2}}}.$$

$$940. a) p^{\frac{1}{3}} \cdot q^{\frac{7}{18}}; b) \frac{b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}} - c}{b^{\frac{3}{4}} + b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{4}}}.$$

$$941. a) \frac{2(m^2 + n^2)}{(m - n)^2}; b) \frac{1}{rs}; c) 2y^{\frac{3}{5}}.$$

A logaritmus fogalma és azonosságai

$$942. a) 3, 2, 1, 2, 0;$$

$$b) 2, 2, 2, 2, 5;$$

$$c) -1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -6;$$

$$d) -\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, -4, \frac{3}{2}, \frac{2}{3};$$

$$e) -\frac{1}{6}, -8, 8, -\frac{1}{4}, -\frac{5}{2}.$$

$$943. a) \frac{4}{5}, \frac{6}{5}, \frac{2}{21}, \frac{1}{2};$$

$$b) 3, -4, \frac{2}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{1}{25}.$$

$$944. a) \text{igaz}, b) \text{igaz}, c) \text{hamis},$$

$$d) \text{igaz}, e) \text{igaz}, f) \text{hamis},$$

$$g) \text{igaz}, h) \text{igaz}, i) \text{hamis},$$

$$j) \text{igaz}, k) \text{igaz}, l) \text{igaz},$$

$$m) \text{hamis}, n) \text{igaz}, o) \text{hamis},$$

$$p) \text{igaz}, q) \text{hamis}.$$

$$945. 132, 7, 8, 5, 3, 1.$$

$$946. a) 5, 36, \frac{16}{3}, 100, \frac{1}{24};$$

$$b) 9, 25, 9, 16, 8;$$

$$c) 27, 64, 16, 3^{10}, \frac{1}{25};$$

$$d) 2, 2, \sqrt[3]{7}, 3, \frac{1}{5}.$$

- 947.** a) 36, 75, $\frac{1}{9}$, 30;
 b) $57\frac{1}{2}$, $781\frac{13}{81}$.
- 948.** a) $x > 4$, $x > \frac{5}{2}$, $x > -\frac{7}{3}$, $x > \frac{18}{5}$;
 b) $|x| > 3$, $|x| > 4$, $|x| > 4$, $|x| > 22$.
- 949.** a) $x > -\frac{5}{3}$, $x \neq 1$, $x > 3$, $x \neq 5$, $|x| > 5$, $x \neq -10$, $|x| > 7$, $|x| \neq 10$;
 b) $-3 < x < 5$, $3,5 < x < 6$, $x > 6$;
 c) $|x| > 4$, $|x| > 2$, $x < 1$ vagy $x > 7$, $x < -5$ vagy $x > 7$.
- 950.** a) $x < 2 \cup x > 6$, $x \neq -4$, $x < -2 \cup x > 5$, $x \neq -6$;
 $x < 0 \cup x > 9$, $x \neq -1$, $x \neq 10$;
 b) $x < -3 \cup x > \frac{1}{2}$, $x < \frac{2}{3} \cup x > 3$, $2 < x < 3$, $x < -\frac{1}{3} \cup x > \frac{3}{2}$;
 c) $x < -7 \cup 5 < x < 7$, $x < -7$, $0 < x < 2 \cup 5 < x < 10$, üres halmaz;
 d) $1 < x \leq 5$, $\frac{1}{2} < x \leq \frac{9}{2}$, $x \geq \frac{3}{2}$.
- 951.** a) $5 < x < 9$, $2 < x \leq 3 \cup 5 \leq x < 6$, $x \neq \frac{8 \pm \sqrt{14}}{2}$;
 b) $x < -2 \cup -1 < x < 1 \cup x > 4$,
 $x < -3 \cup -2 < x < 2 \cup 3 < x < 4 \cup x > 9$, $x \neq \frac{13 \pm \sqrt{29}}{2}$.
- 952.** Jelöljük R -rel az adott kifejezések értékészletét!
 a) $R \leq 0$, $R \leq 2$, $R \leq 8$;
 b) $R \leq 2$, $R \leq -4$, $R \leq 4$.
- 953.** a) $0 < R \leq 4$, $R \geq \frac{1}{6}$, $R \geq \frac{1}{25}$;
 b) $R \leq 0$, $R \leq 0$, $R > 0$, $R \leq -1$.
- 954.** A helyesen kitöltött keresztrejtvényt a 954. ábra mutatja.
955. A helyesen kitöltött keresztrejtvényt a 955. ábra mutatja.

954.

	¹ 1	² 6
³ 4		2
⁴ 7	5	3

955.

¹ 1	0	² 1
0		9
³ 1	0	1

vagy

¹ 1	0	² 1
0		7
³ 1	0	1

IV

956. a) $\lg x = \lg a + \lg b + \lg c$,
 $\lg x = \lg 6 + \lg p + \lg q$,
 $\lg x = \lg 10 + \lg m + 2 \lg n$,
 $\lg x = \lg 5 + \lg (r + s)$,
 $\lg x = \lg (a + b) + \lg (a - b)$;
 b) $\lg x = 2 \lg a + 3 \lg b + 4 \lg c$,
 $\lg x = \lg 2 + 6 \lg p + 3 \lg q + 2 \lg r$,
 $\lg x = \lg (m + n) - \lg (m - n)$,
 $\lg x = \lg a + \lg b + \lg c - \lg 4 - \lg T$.
957. a) $\lg x = \lg 2 + 3 \lg a - \lg 3 - 2 \lg b$,
 $\lg x = \lg 4 + 3 \lg r + \lg \pi - \lg 3$,
 $\lg x = \lg m + \lg n - 2 \lg r$,
 $\lg x = \lg a + 2 \lg b + \lg 2 + \lg p + \lg q - 2 \lg r - 3 \lg s$;
 b) $\lg x = \lg a + \frac{1}{2} \lg b - \lg b - \frac{1}{2} \lg a$,
 $\lg x = 2 \lg p + \frac{1}{3} \lg q - 3 \lg q - \lg (p + q)$,
 $\lg x = \lg m + \frac{1}{5} \lg n - \lg (m + n) - \lg (m - n)$,
 $\lg x = 3 \lg m + \frac{1}{3} \lg n - \frac{1}{2} (3 \lg m + \lg n)$;
 c) $\lg x = \frac{1}{2} \left[\lg a + \frac{1}{2} \lg b - 4 \lg a \right]$,
 $\lg x = \frac{1}{3} \left[4 \lg p + \frac{3}{4} \lg q - 4 \lg p - 2 \lg q \right]$,
 $\lg x = 5 \left(4 \lg m - \frac{2}{3} \lg n \right)$,
 $\lg x = \frac{1}{2} \left(4 \lg s + \frac{1}{3} \left(2 \lg s + \lg r - \frac{1}{2} (\lg s + 3 \lg r) \right) \right)$.
958. a) $x = ab$, $x = \frac{pq}{r}$, $x = m^2 n^3$;
 b) $x = \sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{b}$, $x = \frac{\sqrt[3]{p^2} \cdot \sqrt[4]{q^3}}{\sqrt{r}}$, $x = \sqrt[5]{\left(\frac{a}{b}\right)^3}$.
959. a) $x = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b^2 c}}$, $x = \sqrt[4]{\frac{p^3 q^2}{\sqrt{r}}}$.
960. a) 1, b) 3, c) 2, d) 4.
 961. a) 3, b) 1, c) 4.
 962. a) 4, b) 6, c) 3.
 963. a) -2, b) 4, c) 1, d) 3.

$$964. -\frac{3}{2}.$$

$$965. 1\,404\,371; 201\,533; 30,057.$$

$$966. a) 306,28; 20,728; 36\,202\,551;$$

$$b) 134\,366; 17\,374; 2,057 \cdot 10^{-3}.$$

$$967. 4899,78; 5,696 \cdot 10^{-4}; 1,0156.$$

968. $\lg 75 = \lg 15 + \lg 5 = a$, $\lg 45 = \lg 15 + \lg 3 = b$. E két egyenlőség összege:

$$2 \lg 15 + \lg 3 + \lg 5 = 3 \lg 15 = a + b,$$

$$\text{ahonnan } \lg 15 = \frac{a+b}{3}.$$

969. $\lg 48 = \lg 3 + 4 \lg 2 = p$, $\lg 72 = 2 \lg 3 + 3 \lg 2 = q$. A $\lg 3$ -ban és a $\lg 2$ -ben a kétismeretlenes, elsőfokú egyenletrendszer megoldása: $\lg 2 = \frac{2p-q}{5}$,

$$\lg 3 = \frac{4q-3p}{5}.$$

$$\text{Tehát } \lg 6 = \lg 2 + \lg 3 = \frac{3q-p}{5}.$$

$$970. \lg(10!) = \lg 2 + \lg 3 + \lg 4 + \lg 5 + \lg 6 + \lg 7 + \lg 8 + \lg 9 + \lg 10 = 4n + 6m + k + 2.$$

$$971. \log_{\sqrt[6]{150}} = \frac{1}{2}(\log_6 6 + \log_6 25) = \frac{1+2k}{2}.$$

972. A feltételből $\log_p \frac{p}{q} = 1 - \log_p q = \frac{1}{3}$, azaz $\log_p q = \frac{2}{3}$. Írjuk át a kiszámítandó mennyiséget p alapra.

$$\frac{\log_p \frac{p^5}{\sqrt{q}}}{\log_p \frac{p}{q}} = \frac{5 - \frac{1}{2} \log_p q}{1 - \log_p q} = \frac{5 - \frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 14.$$

973. A feltételekből

$$\log_x a = \frac{1}{p}, \quad \log_x b = \frac{1}{q}, \quad \log_x abc = \frac{2}{p+q};$$

$$\log_x a + \log_x b + \log_x c = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \log_x c = \frac{2}{p+q}.$$

Innen

$$\log_x c = \frac{2}{p+q} - \frac{1}{p} - \frac{1}{q} = -\frac{p^2+q^2}{pq(p+q)}, \quad \text{tehát } \log_c x = -\frac{pq(p+q)}{p^2+q^2}.$$

974. Először azt bizonyítjuk, hogy $2\sqrt{2} < \log_2 3 + 2\log_3 2$. Osszuk el mindkét oldalt $\sqrt{2}$ -vel:

$$2 < \frac{\log_2 3}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{\log_2 3}.$$

Mivel $2^{\sqrt{2}} < 2^{\frac{3}{2}} < 3$, így jobb oldalon egy 1-től különböző, pozitív számnak és reciprokának összege szerepel, melyről tudjuk, hogy nagyobb 2-nél.

Az egyenlőtlenség másik oldalának bizonyításához vezessük be a $\log_2 3 = y$ ismeretlent.

$$y + \frac{2}{y} < 3, \text{ azaz } y^2 - 3y + 2 < 0.$$

Ez utóbbi egyenlőtlenség megoldása: $1 < y < 2$. Mivel $1 < \log_2 3 < 2$, ezért az eredeti egyenlőtlenség igaz.

- 975.** a) Térjünk át a bal oldalon a alapú logaritmusra!
 b) Térjünk át a jobb oldalon a alapú logaritmusra!
 c) Vegyük mindkét oldal b alapú logaritmusát, és alkalmazzuk a logaritmus megfelelő azonosságát!
 d) Térjünk át a bal oldal mindhárom tényezőjében ugyanolyan alapra (pl. a alapra)!

976. a) Az egyenlőség jobb oldala így alakítható:

$$1 + \log_a b = 1 + \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_c a + \log_c b}{\log_c a} = \frac{\log_c ab}{\log_c a} = \frac{\log_a c}{\log_{ab} c}.$$

b) Térjünk át az egyenlőség bal oldalán b alapra:

$$\frac{\log_b an}{\log_b bn} = \frac{\log_b a + \log_b n}{1 + \log_b n}.$$

c) Térjünk át az egyenlőség bal oldalán b alapra!

d) Az egyenlőség bal oldala így alakítható:

$$\log_b a + \log_b a^2 + \log_b a^3 + \log_b a^4 = \log_b (a \cdot a^2 \cdot a^3 \cdot a^4) = \log_b a^{10} = 10 \cdot \log_b a.$$

977. Írjuk át mindkét oldal minden tagját n alapra:

$$2\log_n b = \log_n (c - a) + \log_n (c + a) = \log_n (c^2 - a^2),$$

ahonnan $b^2 = c^2 - a^2$, ez pedig Pitagorasz tétele szerint valóban igaz.

978. Az egyenlőség így alakítható:

$$2\log_x m = \log_x p + \log_x q = \log_x pq,$$

ahonnan $m^2 = pq$, ez pedig a jól ismert magasságtétel.

979. Térjünk át minden tagban és tényezőben x alapra! A bal oldal:

$$\frac{\log_x a \cdot \log_x b}{\log_x p \cdot \log_x q}.$$

A jobb oldal:

$$\frac{\frac{1}{\log_x q} - \frac{1}{\log_x p}}{\frac{1}{\log_x b} - \frac{1}{\log_x a}} = \frac{\frac{\log_x p - \log_x q}{\log_x p \cdot \log_x q}}{\frac{\log_x a - \log_x b}{\log_x a \cdot \log_x b}} = \frac{\log_x \frac{p}{q}}{\log_x p \cdot \log_x q} \cdot \frac{\log_x a \cdot \log_x b}{\log_x \frac{a}{b}}.$$

A bal oldalt és a jobb oldalt összevetve ezt kapjuk:

$$\frac{\log_x \frac{p}{q}}{\log_x \frac{a}{b}} = 1, \quad \text{ahonnan} \quad \frac{a}{b} = \frac{p}{q}.$$

980. Mivel $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$, így valóban

$$\log_{2 + \sqrt{3}}(2 - \sqrt{3}) = \log_{2 + \sqrt{3}}(2 + \sqrt{3})^{-1} = -1.$$

981. A bal oldal mindkét tagja -1 (lásd előző feladat).

982. Térjünk át x alapra:

$$\begin{aligned} (\log_{n!} x)^{-1} &= \log_x n! = \log_x 2 + \log_x 3 + \log_x 4 + \dots + \log_x n = \\ &= \frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \dots + \frac{1}{\log_n x} = \sum_{i=2}^n \frac{1}{\log_i x} = \sum_{i=2}^n (\log_i x)^{-1}. \end{aligned}$$

Nehezebb feladatok a témakörből

983. Először kiszámítjuk A -t és B -t.

$$A = \left(\frac{2^9 - 2^4}{31} \right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{2^4(2^5 - 1)}{31} \right)^{\frac{1}{4}} = 2,$$

$$B = \left(-\log_8 \frac{1}{2} \right)^{-1} = 3.$$

A C mennyiségnek csak akkor van értelme, ha $-p^2 - 4p + 60 > 0$, ahonnan $-10 < p < 6$.

Mivel $-p^2 - 4p + 60 = -(p + 2)^2 + 64$, ezért

$$C = \log_8 (-p^2 - 4p + 60) \leq \log_8 64 = 2.$$

Ezek szerint csak A lehet a mértani közép: $A^2 = B \cdot C$;

$$4 = 3 \cdot \log_8 (-p^2 - 4p + 60), \quad \text{azaz} \quad p^2 + 4p - 44 = 0,$$

ahonnan $p = -2 \pm 4\sqrt{3}$.

984. Ha $\log_{x^2} a = \log_{xy} b = \log_{y^2} (a + 2b) = k$, akkor
 $a = x^{2k}$, $b = x^k y^k$ és $a + 2b = y^{2k}$,

vagyis $x^{2k} + 2x^k y^k = y^{2k}$, azaz $\left(\frac{x}{y}\right)^k + 2 = \left(\frac{y}{x}\right)^k$.

IV

De $\left(\frac{x}{y}\right)^k = \frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha$, így ezt kapjuk:

$\operatorname{tg} \alpha + 2 = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$, azaz $\operatorname{tg}^2 \alpha + 2 \operatorname{tg} \alpha - 1 = 0$.

Innen a szóba jöhető $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{2} - 1$, ahonnan $\alpha = 22,5^\circ$.

985. $x > 0$. A $4y^2 - 37y + 9 \geq 0$ egyenlőtlenség megoldása: $y \leq \frac{1}{4}$ vagy $y \geq 9$.

Ezek szerint

a) $\log_2 x \leq \frac{1}{4}$ vagy $\log_2 x \geq 9$;

b) $\log_2^2 x \leq \frac{1}{4}$ vagy $\log_2^2 x \geq 9$.

Az a) esetben

$$x \leq \sqrt[4]{2} \quad \text{vagy} \quad x \geq 2^9 = 512.$$

A b) esetben


$$-\frac{1}{2} \leq \log_2 x \leq \frac{1}{2}, \quad \text{vagy} \quad \log_2 x \leq -3, \quad \text{vagy} \quad \log_2 x \geq 3;$$

azaz

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \sqrt{2}, \quad \text{vagy} \quad 0 < x \leq \frac{1}{8}, \quad \text{vagy} \quad x \geq 8.$$

Ábrázoljuk egy számgyenesen az A és B halmazok elemeit:

985.



$A \cap B - A$ halmaz elemei:

$$\sqrt[4]{2} < x \leq \sqrt{2} \quad \text{vagy} \quad 8 \leq x < 512.$$

986. Mivel $\log_x xyz^9 = 1 + \log_x y + 9\log_x z$, ezért az egyenlőtlenség bal oldala így írható:

$$\log_x y + \log_y z + \log_z x + \frac{9}{\log_x y} + \frac{9}{\log_y z} + \frac{9}{\log_z x} > 18.$$

De

$$\log_x y + \frac{9}{\log_x y} = 3 \cdot \left(\frac{\log_x y}{3} + \frac{3}{\log_x y} \right).$$

Itt a jobb oldalon egy pozitív számnak és reciprokának összege szerepel, ami legalább 2. Ezek szerint

$$\log_x y + \frac{9}{\log_x y} = 3 \cdot \left(\frac{\log_x y}{3} + \frac{3}{\log_x y} \right) \geq 6,$$

vagyis

$$\log_x y + \log_y z + \log_z x + \frac{9}{\log_x y} + \frac{9}{\log_y z} + \frac{9}{\log_z x} \geq 18.$$

Egyenlőség akkor teljesülne, ha

$$\log_x y = \log_y z = \log_z x = 3$$

lenne, ahonnan $x = y = z = 0$ vagy $x = y = z = 1$ lenne, tehát az eredeti egyenlőtlenség valóban igaz.

987. A kitűzött egyenlőtlenség bal oldala:

$$(2\log_a b + 4\log_b a)^2 + 3,$$

tehát

$$(2\log_a b + 4\log_b a)^2 + 3 > 2\sqrt{3}(2\log_a b + 4\log_b a),$$

$$2\log_a b + 4\log_b a + \frac{3}{2\log_a b + 4\log_b a} > 2\sqrt{3},$$

$$\frac{2\log_a b + 4\log_b a}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{2\log_a b + 4\log_b a} > 2.$$

Már csak azt kell belátnunk, hogy

$$\frac{2\log_a b + 4\log_b a}{\sqrt{3}} \neq 1, \text{ azaz } 2\log_a b + \frac{4}{\log_a b} - \sqrt{3} \neq 0.$$

Mivel a $2x^2 - \sqrt{3}x + 4 = 0$ másodfokú egyenlet diszkriminánsa -30 , így az egyenlőtlenség – és ezzel az eredeti egyenlőtlenség is – teljesül.

988. Legyen ${}^{2005}\sqrt{2} = a$, ${}^{2005}\sqrt{3} = b$, ${}^{2005}\sqrt{4} = c$. Azt kell belátnunk, hogy

$$a^2 + b^2 + c^2 > ab + ac + bc.$$

$$2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2ac - 2bc > 0,$$

$$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (a - c)^2 > 0.$$

Ez pedig nyilvánvaló.

989. A feladat megoldásának gondolatmenete azonos a 974. feladat megoldásával.

990. A C mennyiségnél térjünk át közös (pl. 2-es) alapra:

$$C = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 5}{\log_2 3} \cdot \frac{1}{\log_2 5} = 1.$$

A másik két mennyiségre:

$$A = \log_2 3 = \log_4 9 > \log_4 8 = \frac{3}{2},$$

$$1 < B = \log_3 5 = \log_9 25 < \log_9 27 = \frac{3}{2}.$$

Tehát a sorrend: $A > B > C$.

991. Ha $a \neq 1$, akkor (átterve minden tagban a alapra):

$$\frac{\log_a k}{1 + 2 \log_a b} + \frac{\log_a k}{2 + \log_a b} = \frac{\log_a k}{1 + \log_a b} + \frac{\log_a k}{2 + 2 \log_a b}.$$

Modellezve ezt az egyenlőséget:

$$\frac{1}{1 + 2x} + \frac{1}{2 + x} = \frac{1}{1 + x} + \frac{1}{2 + 2x}, \quad \text{ahonnan} \quad 2x^2 + 5x + 2 = 2x^2 + 4x + 2.$$

Innen $x = \log_a b = 0$, így valóban $b = 1$.

992. Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

a) $x^2 - 1 > 0$, b) $-x^2 + 2x + 15 > 0$,

c) $-\log_3^2(x^2 - 1) + 3 \log_3(x^2 - 1) + 4 \geq 0$.

a) esetben $|x| > 1$. b) esetben a másodfokú kifejezés zérushelyei: 5 és -3 , tehát $-3 < x < 5$. c) esetben a $-y^2 + 3y + 4 \geq 0$ egyenlőtlenséget kell megoldanunk.

E másodfokú kifejezés zérushelyei: 4 és -1 , tehát

$$-1 \leq \log_3(x^2 - 1) \leq 4, \quad \text{ahonnan} \quad \frac{2}{\sqrt{3}} \leq |x| \leq \sqrt{82}.$$


Mindhárom feltételt figyelembe véve az értelmezési tartomány:

$$-3 < x \leq -\frac{2}{\sqrt{3}} \quad \text{vagy} \quad \frac{2}{\sqrt{3}} \leq x < 5.$$

993. Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

$$4^x - 68 \cdot 2^x + 256 \geq 0, \quad 16^x - 68 \cdot 4^x + 256 \geq 0, \quad -x^2 + x + 30 > 0.$$

Az egyenlőtlenségek megoldásait ábrázoltuk az alábbi számevgyenesen:



Az eredeti kifejezés értelmezési tartománya: $-5 < x \leq 1$.

994. Az $x > 0$, $x \neq 1$, $-7x^2 + 29x - 4 \geq 0$, $\log_x 5 > \log_5 x$ feltételeknek kell teljesülniük. Az eredeti kifejezés értelmezési tartománya: $\frac{1}{7} \leq x < \frac{1}{5}$.

995. A megadott kifejezés így írható:

$$\begin{aligned} \log_{\sqrt{2}}(a-b) - \log_{\sqrt{2}} \sqrt{ab} &= \log_{\sqrt{2}} \frac{a-b}{\sqrt{ab}} = \log_2 \frac{a^2 + b^2 - 2ab}{ab} = \\ &= \log_2 \frac{18ab - 2ab}{ab} = 4. \end{aligned}$$

996. Mivel

$$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\dots \sqrt{2}}}} = 2^{\frac{1}{2^n}},$$

ezért

$$-\log_2 \log_2 \sqrt{\sqrt{\sqrt{\dots \sqrt{2}}}} = -\log_2 \log_2 2^{\frac{1}{2^n}} = -\log_2 \frac{1}{2^n} = -\log_2 2^{-n} = n.$$

997. A téglalap koordinátái párhuzamosak a tengelyekkel, a megadott egyenes pedig áthalad az átlók metszéspontján. A téglalap T területe:

$$T = (\lg 8^n - \lg 2^n)(\lg 16^n - \lg 8^n) = \lg \frac{8^n}{2^n} \cdot \lg \frac{16^n}{8^n} = 2n^2 \cdot \lg^2 2.$$

Az átlók O metszéspontja:

$$x_O = \frac{\lg 2^n + \lg 8^n}{2} = \frac{\lg 16^n}{2} = 2n \lg 2,$$

$$y_O = \frac{\lg 8^n + \lg 16^n}{2} = \frac{7}{2} n \lg 2.$$

E koordináták kielégítik az $y = x + 1$ egyenletet, tehát

$$\frac{7}{2} n \lg 2 = 2n \lg 2 + 1, \quad \text{ahonnan} \quad n \lg 2 = \frac{2}{3}.$$

Tehát a téglalap T területe:

$$T = 2n^2 \lg^2 2 = 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}.$$

998. Ha $y = 0$, akkor $x = \frac{9}{\log_3 a}$. Ha $x = 0$, akkor $y = \frac{9}{\log_3 a^{-2}}$.

Az egyenes és a tengelyek alkotta háromszög T területe:

$$T = \left| \frac{9}{\log_3 a} \cdot \frac{9}{\log_3 a^{-2}} \right| \cdot \frac{1}{2} = \frac{81}{16},$$

azaz

$$\log_3^2 a = 4, \text{ ahonnan } a = 9 \text{ vagy } a = \frac{1}{9}.$$

IV

Ha $a = 9$, akkor az egyenes egyenlete: $2x - 4y = 9$. Ennek a tengelyekkel alkotott metszéspontjai: $x = \frac{9}{2}$, $y = -\frac{9}{4}$.

Ha $a = \frac{1}{9}$, akkor $-2x + 4y = 9$. Ekkor a metszéspontok: $x = -\frac{9}{2}$, $y = \frac{9}{4}$.

Tehát két egybevágó háromszögről van szó. Ezek átfogója:

$$\sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2 + \left(\frac{9}{4}\right)^2} = \frac{9\sqrt{5}}{4}.$$

Tehát a háromszög K kerülete:

$$K = \frac{9}{2} + \frac{9}{4} + \frac{9\sqrt{5}}{4} = \frac{9}{4} \cdot (3 + \sqrt{5}).$$

999. A V térfogat:

$$V = \log_a b \cdot \log_b a \cdot \log_a ab = \log_a ab.$$

Az A felszín:

$$A = 2 \cdot (\log_a b \log_b a + \log_a b \log_a ab + \log_b a \log_a ab),$$

$$A = 2 \cdot [1 + \log_a ab (\log_a b + \log_b a)] = 2 \cdot [1 + V(\log_a b + \log_b a)],$$

$$\frac{A}{V} = 2 \cdot \left(\frac{1}{V} + \log_a b + \log_b a \right).$$

De $\log_a b + \log_b a \geq 2$, így a jobb oldalon a zárójelben levő mennyiség nagyobb, mint 2, azaz

$$\frac{A}{V} > 4,$$

és éppen ezt kellett belátnunk.