

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 3.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet láta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy a **hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy félösszeges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket**.
 - helyes lépés: *kipipálás*
 - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
 - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
 - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott vagy áthúzott kipipálás*
 - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
 - nem érthető rész: *kérdőjel és/vagy hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért **jatalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el**: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (\sin , \cos , \tg , \log és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont**.
11. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
12. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a szárálkban megadott helyes válasz is elfogadható.
13. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadott eltérő, **ézszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
14. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

I.

1.

$B = \{1; 2; 3; 4\}$	2 pont	
Összesen:	2 pont	

2.

(Pitagorasz-tétellel: $\sqrt{26^2 - 10^2} = 24$ cm)	2 pont	
Összesen:	2 pont	

3.

-3	2 pont	<i>Nem bontható.</i>
Összesen:	2 pont	

4.

$(840 : 0,35 =) 2400$ Ft	2 pont	
Összesen:	2 pont	

5.

A grafikon lineáris függvény grafikonja, melynek meredeksége 2,	1 pont	
az y tengelyt a (-1) -ben metszi,	1 pont	
és a megfelelő intervallumon van ábrázolva.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

6.

A megadott öt pozitív egész szám átlaga 4,	1 pont	<i>Néhány példa a jó megoldásra: 3, 3, 3, 3, 8, vagy 2, 3, 3, 3, 9, vagy 1, 2, 3, 3, 11.</i>
egyetlen módszera 3.	1 pont	
Összesen:	2 pont	

7.

g, i	2 pont	<i>Egy helyes, vagy két helyes és egy hibás válasz esetén 1 pont jár.</i>
Összesen:	2 pont	

8.

$$\left(\frac{(10-2) \cdot 180^\circ}{10} = 180^\circ - \frac{360^\circ}{10} = \right) 144^\circ$$

2 pont

Összesen: **2 pont****9.**

$$4^x = 32$$

1 pont

$$x = \log_4 32$$

$$1 \text{ pont} \quad 2^{2x} = 2^5$$

$$x = 2,5$$


1 pont

Összesen: **3 pont****10.**

$360^\circ : 18 = 20^\circ$, így az egyes osztályzatokat ábrázoló körcikkek középponti szögei rendre: $20^\circ, 60^\circ, 80^\circ, 120^\circ, 80^\circ$.

1 pont

Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.



2 pont

Összesen: **3 pont****11.**

1122, 1212, 2112


3 pont

*Minden megfelelő számért 1 pont jár.
Ha a vizsgázó hibás számo(ka)t is ír, akkor ezért összesen 1 pontot veszítsen.*

Összesen: **3 pont**

12.


Lehet 2 ismerőse,
az ehhez tartozó gráf:



1 pont

1 pont

Lehet 4 ismerőse,
ebben az esetben a gráf:



1 pont

1 pont

Összesen: 4 pont

II. A**13. a)**

Közös nevezőre hozunk:

$$\frac{9x+3}{6} + \frac{2x-2}{6} = 13$$

$$9x + 3 + 2x - 2 = 78$$

$$11x = 77$$

$$x = 7$$

Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra hivatkozással.

Összesen:**1 pont***Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.***1 pont****1 pont****1 pont****1 pont****5 pont****13. b) első megoldás**Négyzetre emelünk: $x - 1 = 49 - 14x + x^2$.

$$x^2 - 15x + 50 = 0$$


Az egyenlet gyökei $x_1 = 5$ és $x_2 = 10$.

Ellenőrzés: az 5 megoldása az eredeti egyenletnek,

a 10 nem megoldása az eredeti egyenletnek.

Összesen:**1 pont****1 pont****2 pont****1 pont***Ez a 2 pont akkor is jár, ha a vizsgázó az $1 \leq x \leq 7$ feltétel mellett az ekvivalenciára hivatkozik.***1 pont****6 pont****13. b) második megoldás**

Grafikus megoldás:

**4 pont***2 pont a négyzetgyökös, 2 pont a lineáris függvény helyes ábrázolásáért jár.*A grafikonkról leolvasva $x = 5$.**1 pont**

Ellenőrzés behelyettesítéssel.

1 pont**Összesen:****6 pont**

14. a)

(A mértani sorozat hányadosát q -val jelölve:)
 $a_4 = 0,75 \cdot q^3 = 6.$

1 pont

Ebből $q^3 = 8,$

1 pont

azaz $q = 2.$

1 pont

$$S_{20} = 0,75 \cdot \frac{2^{20} - 1}{2 - 1} =$$

1 pont

$$= 786\,431,25$$

1 pont

Összesen: 5 pont**14. b) első megoldás**

A sorozat első tagját a -val, különbségét d -vel jelölve,
a szöveg alapján: $a + (a + d) + (a + 2d) = 18,$

1 pont

$$\text{valamint } (a + 2d) + (a + 3d) = a + (a + d) + 28.$$

1 pont

A harmadik tag 2d-vel nagyobb az elsőnél, a negyedik tag 2d-vel nagyobb a másodiknál, így $4d = 28.$

$$\text{A második egyenletből } d = 7.$$

2 pont

$$\text{Ezt az első egyenletbe helyettesítve } a = -1.$$

1 pont

$$\text{A sorozat 20. tagja: } a_{20} = 132.$$

$$S_{20} = \frac{-1 + 132}{2} \cdot 20 = 1310$$

2 pont

$$-1 + 6 + 13 + \dots + 132 = \\ = 1310$$

Összesen: 7 pont**14. b) második megoldás**

A sorozat második tagját b -vel, különbségét d -vel
jelölve, a szöveg alapján: $(b - d) + b + (b + d) = 18,$
ahonnan $b = 6.$

1 pont

1 pont

A második feltétel szerint

1 pont

$$(b + d) + (b + 2d) = (b - d) + b + 28,$$

1 pont

$$\text{ahonnan } d = 7.$$

1 pont

$$\text{Így a sorozat első tagja: } b - d = -1.$$

1 pont

$$S_{20} = \frac{2 \cdot (-1) + 19 \cdot 7}{2} \cdot 20 = 1310$$

2 pont

Összesen: 7 pont

15. a)

A doboz térfogata: $V = 13^2 \cdot \pi \cdot 18 \approx$ $\approx 9557 \text{ cm}^3$,	1 pont 1 pont	
azaz kb. 9,6 liter.	2 pont	<i>1 pont jár a helyes mértékegyeségváltásért, 1 pont jár a helyes kerekítésért.</i>
Összesen:	4 pont	

15. b)

Egy ilyen méretű forgáshenger felszíne: $2 \cdot 13^2 \cdot \pi + 2 \cdot 13 \cdot \pi \cdot 18 \approx$ $\approx 2532 \text{ cm}^2$.	1 pont	
Az egy dobozhoz felhasznált lemez területe tehát $1,18 \cdot 2532 \approx 2988 \text{ cm}^2 \approx$ $\approx 0,3 \text{ m}^2$,	1 pont	
így 1000 doboz elkészítéséhez kb. 300 m^2 fémlemez szükséges.	1 pont	.
Összesen:	5 pont	

15. c) első megoldás

Mivel $800 : 2000 = 2 : 5$, ezért a legkisebb doboz ára legyen (forintban számolva) $2x$, a középsőé $5x$.	1 pont	
$2x + 5x = 2100$	1 pont	
$x = 300$	1 pont	
A legkisebb doboz ára ($2 \cdot 300 =$) 600 Ft, a középső doboz ára pedig ($5 \cdot 300 =$) 1500 Ft.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

15. c) második megoldás

A legkisebb doboz ára legyen (forintban számolva) $800x$, a középsőé $2000x$.	1 pont	<i>Összesen 2800 cm^2 lemez kerül 2100 Ft-ba, így 1 cm^2 lemez ára $2100 : 2800 = 0,75 \text{ Ft}$.</i>
$800x + 2000x = 2100$	1 pont	
$x = 0,75$	1 pont	
A legkisebb doboz ára ($800 \cdot 0,75 =$) 600 Ft, a középső doboz ára pedig ($2000 \cdot 0,75 =$) 1500 Ft.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

II. B**16. a) első megoldás**

Az egyenes egy irányvektora: $\overrightarrow{AB}(1; -4)$,	1 pont	
egy normálvektora: $(4; 1)$,	1 pont	
így az egyenes egyenlete: $4x + y = 4$.	1 pont	$-4x - y = -4$
Összesen:	3 pont	

16. a) második megoldás

Az egyenes az y tengelyt a $b = 4$ -nél metszi,	1 pont	
meredeksége pedig $m = -4$,	1 pont	
így az egyenes egyenlete $y = -4x + 4$.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

16. b) első megoldás

$\overrightarrow{AD} = ((5; 6) - (0; 4)) = (5; 2)$	2 pont	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (1; -4)$
$\overrightarrow{BC} = ((6; 2) - (1; 0)) = (5; 2)$		
Mivel a négyszög két szemközti oldalvektora egyenlő (és így két szemközti oldal párhuzamos és egyenlő hosszú), az állítást beláttuk.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

16. b) második megoldás

A négyszög oldalainak hossza: $ AB = DC = \sqrt{1^2 + (-4)^2} = \sqrt{17}$, $ AD = BC = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$.	2 pont	
Mivel a négyszög szemközti oldalai egyenlő hosszúak, így az állítást beláttuk.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

16. b) harmadik megoldás

Az AB és a DC oldalegyenesek meredeksége is -4 (például ábra alapján).	2 pont	
Az AD és az BC oldalegyenesek meredeksége $\frac{2}{5}$.		
Mivel a négyszög szemközti oldalegyeneséinek meredeksége egyenlő, ezért azok párhuzamosak, így az állítást beláttuk.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

16. b) negyedik megoldás

A négyzet két átlójának felezőpontja:

$$F_{AC} = \left(\frac{0+6}{2}; \frac{4+2}{2} \right) = (3; 3),$$

$$F_{BD} = \left(\frac{1+5}{2}; \frac{0+6}{2} \right) = (3; 3).$$


2 pont

A négyzet átlóinak felezőpontja egybeesik (azaz az átlók felezik egymást), így az állítást beláttuk.

1 pont

A négyzet középpontosan szimmetrikus, így az állítást beláttuk.

Összesen: 3 pont

16. c) első megoldás

1 pont

A kérdéses szöget bezáró két oldal hossza:

$$AB = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}, \quad BC = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}.$$

1 pont

$$\text{Az } AC \text{ átló hossza: } \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40}.$$

Az ABC háromszögben a kérdéses szöget φ -vel jelölve és felírva a koszinusz-tételt:

$$\sqrt{40}^2 = \sqrt{17}^2 + \sqrt{29}^2 - 2 \cdot \sqrt{17} \cdot \sqrt{29} \cdot \cos \varphi.$$

1 pont

$$\cos \varphi = \frac{3}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{29}} (\approx 0,1351),$$

2 pont

$$\text{innen } \varphi \approx 82,2^\circ.$$

1 pont

Összesen: 6 pont

16. c) második megoldás

A kérdéses szöget bezáró két vektor koordinátái:
 $\overrightarrow{BA} = (-1; 4)$; $\overrightarrow{BC} = (5; 2)$.

1 pont

A két vektor skaláris szorzata a koordinátákkal:
 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-1) \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 3$.

1 pont

A két vektor hossza: $|\overrightarrow{BA}| = \sqrt{(-1)^2 + 4^2} = \sqrt{17}$,
 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$.

1 pont

A közbezárt szöget φ -vel jelölve a két vektor skaláris szorzata a definíció szerint:

1 pont

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \sqrt{17} \cdot \sqrt{29} \cdot \cos \varphi.$$

A felírt skaláris szorzatok egyenlők, így

$$\cos \varphi = \frac{3}{\sqrt{17} \cdot \sqrt{29}},$$

1 pont


$$\text{azaz } \varphi \approx 82,2^\circ.$$

1 pont

Összesen: 6 pont

16. c) harmadik megoldás

(Legyen az A pont merőleges vetülete az x tengelyen $P(0; 0)$, a C ponté pedig $R(6; 0)$. A kérdéses hegyesszöget jelölje φ , a mellett lévő két hegyesszöget pedig ε és σ .)



1 pont

Az APB derékszögű háromszögben:

$$\operatorname{tg} \varepsilon = \frac{4}{1},$$

1 pont

$$\varepsilon \approx 76,0^\circ.$$

1 pont

Hasonlóan az BRC derékszögű háromszögben:

$$\operatorname{tg} \sigma = \frac{2}{5},$$

1 pont

$$\sigma \approx 21,8^\circ.$$

1 pont

$$\varphi = 180^\circ - \sigma - \varepsilon \approx 82,2^\circ$$

1 pont

Összesen: 6 pont

16. d) első megoldás

A négy csúcsot az E, F, G és H betűkkel ($4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ -féleképpen betűzhetjük meg (összes eset)).

1 pont

Az E jelű csúcs 4 helyen lehet.

1 pont

*E és F az egyik oldal két végpontja lehet.
Ez $4 \cdot 2 = 8$ lehetőség.*

Innen 2 irányban is lehet szabályosan betűzni (az irány eldöntése után a betűzés már egyértelmű),

1 pont

Mindegyik esetben csak egyféleképpen helyezkedhet el szabályosan G és H .

így a kedvező esetek száma $4 \cdot 2 = 8$.

1 pont

Tehát a kedvező esetek száma is 8.

A keresett valószínűség: $\frac{8}{24} \left(= \frac{1}{3}\right)$.

1 pont

Összesen: **5 pont**

16. d) második megoldás

Az E betű helyét valamelyik csúcsban rögzítjük.

1 pont

Ekkor a többi betűt $3!$ -féleképpen helyezhetjük el.
Az összes eset száma így 6.

1 pont


Ezek közül 2 kedvező, szabályos betűzésű.

2 pont

A keresett valószínűség: $\frac{2}{6} \left(= \frac{1}{3}\right)$.

1 pont

Összesen: **5 pont**

17. a)

2 pont

Összesen: **2 pont**

17. b)

A kicsi, szürke, nem lyukas négyzet és a kicsi, fehér, nem lyukas négyzet bekarikázása.



2 pont

Egy jó, vagy két jó és egy rossz válasz esetén 1 pont, minden más esetben 0 pont jár.

Összesen: **2 pont****17. c) első megoldás**

Összesen $\binom{16}{2}$ -féleképpen húzhatunk.

1 pont

A készletben 4 darab kicsi háromszög van. Közülük $\binom{4}{2}$ -féleképpen húzhatunk kettőt (kedvező esetek száma).

1 pont

A keresett valószínűség: $\frac{\binom{4}{2}}{\binom{16}{2}} =$

1 pont

$$= \frac{6}{120} (= 0,05).$$

1 pont

Összesen: **4 pont****17. c) második megoldás**

Mivel a készletben 4 darab kicsi háromszög van, ezért annak a valószínűsége, hogy az első húzott elem kicsi háromszög: $\frac{4}{16}$.

1 pont

Annak a valószínűsége, hogy az második húzott elem is kicsi háromszög: $\frac{3}{15}$.

1 pont

A keresett valószínűség $\frac{4}{16} \cdot \frac{3}{15} =$

1 pont

$$= \frac{12}{240} (= 0,05).$$

1 pont

Összesen: **4 pont**

17. d) első megoldás

A háromszög egyik oldalának hossza: $AC = 3\sqrt{2}$ ($\approx 4,24$) (cm),	2 pont	$AC = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18}$
másik oldalának hossza: $CE = 3$ (cm),	1 pont	
a két oldal által bezárt szöge: $ACE \angle = 45^\circ + 60^\circ = 105^\circ$.	1 pont	
$T_{ACE} = \frac{3\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \sin 105^\circ}{2} \approx$ $\approx 6,15$ (cm^2)	1 pont	
Összesen:	6 pont	

17. d) második megoldás

A négyzet és a szabályos háromszög területe együtt $3^2 + \frac{3^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 9 + 2,25 \cdot \sqrt{3}$ ($\approx 12,90$ cm^2).	2 pont	
Az ABE háromszög AB -hez tartozó magassága 1,5 (cm), az ABE háromszög területe tehát 2,25 (cm^2).	1 pont	
Az ADC háromszög területe 4,5 (cm^2).	1 pont	
Tehát a kérdezett terület: $9 + 2,25 \cdot \sqrt{3} - 2,25 - 4,5 \approx$ $\approx 6,15$ (cm^2).	1 pont	
Összesen:	6 pont	

17. e) első megoldás

$BA = 3$ cm, $BC = 3$ cm, $BE = 3$ cm	1 pont	
Mivel a B pont egyenlő távolságra van a három csúcstól, ezért a B pont az ACE háromszög körülírt körének középpontja. (Így az állítást beláttuk.)	2 pont	
Összesen:	3 pont	

17. e) második megoldás

A háromszög körülírt körének középpontja bármely két oldalfelező merőleges metszéspontjaként is megkapható.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
Az AC (ától) oldalfelező merőlegese a BD átló ellenesére, így átmegy a B ponton.	1 pont	
Az EC oldal felezőmerőlegese (a BCE szabályos háromszög magasságvonala) is átmegy a B ponton. (Tehát az állítás igaz.)	1 pont	
Összesen:	3 pont	

18. a)

(Páros számokat dobtak, és az összegük 6-nál kisebb volt, így) a két dobott szám csak a 2, 2 lehetett.	1 pont	
A nyeremény ($4 \cdot 20 + 3 \cdot 20 + 2 \cdot 20 = 180$ pont).	1 pont	
Andreának tehát ($180 - 60 = 120$ ponttal nőtt a pontszáma,	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
így a játék végén ($120 + 120 = 240$ pontja lett.)	1 pont	
Összesen:	4 pont	

18. b)

Két páratlan számot dobtak, melynek az összege legalább 6,	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
így a lehetséges dobások: 1, 5 (valamelyen sorrendben); 3, 3; 3, 5 (valamelyen sorrendben); 5, 5.	2 pont	
Összesen:	3 pont	

18. c)

Ha x ponttal fogadott az A eseményre, akkor $2x$ ponttal fogadott az E-re, és $70 - 3x$ ponttal fogadott a D eseményre.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A feladat szövege alapján: $4 \cdot x + 2 \cdot (70 - 3x) + 3 \cdot 2x = 200.$	2 pont	
$4x + 140 = 200$	1 pont	
$x = 15$, azaz Balázs 15 ponttal fogadott az A eseményre.	1 pont	
Ellenőrzés (30 ponttal fogadott az E, $70 - 45 = 25$ ponttal fogadott a D eseményre, és $4 \cdot 15 + 2 \cdot 25 + 3 \cdot 30 = 200$ valóban).	1 pont	
Összesen:	6 pont	

18. d) első megoldás

Három kockával összesen ($6 \cdot 6 \cdot 6 =$) 216-féleképpen dobhatunk.

1 pont

($5 \cdot 5 \cdot 5 =$) 125-féleképpen dobhatunk úgy, hogy nincs 5-ös a dobásaink között.

1 pont

($216 - 125 =$) 91 esetben lesz 5-ös a dobott számok között.

1 pont

A keresett valószínűség $\frac{91}{216}$ ($\approx 0,42$).

1 pont

Összesen: **4 pont**

18. d) második megoldás

Annak a valószínűsége, hogy egy kockával dobva nem 5-öst dobunk: $\frac{5}{6}$.

1 pont

Annak a valószínűsége, hogy három kockával dobva egyik dobás sem 5-ös: $\left(\frac{5}{6}\right)^3$.

1 pont

Annak a valószínűsége, hogy három kockával dobva legalább az egyik dobás 5-ös: $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 =$

1 pont

$= \frac{91}{216}$.

1 pont

Összesen: **4 pont**

18. d) harmadik megoldás

Annak a valószínűsége, hogy minden három kockával 5-öst dobunk: $\left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$.

1 pont

 $\frac{1}{6^3}$

Annak a valószínűsége, hogy három kockával dobva pontosan két 5-öst dobunk: $\binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right) = \frac{15}{216}$.

1 pont

 $\frac{\binom{3}{2} \cdot 1^2 \cdot 5}{6^3}$

Annak a valószínűsége, hogy három kockával dobva pontosan egy 5-öst dobunk: $\binom{3}{1} \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{75}{216}$.

1 pont

 $\frac{\binom{3}{1} \cdot 1 \cdot 5^2}{6^3}$

A kérdezett valószínűség ezek összege, azaz $\frac{91}{216}$.

1 pont

Összesen: **4 pont**